

داروهای خوراکی پوکی استخوان و احتمال افزایش خطر ابتلا به سرطان مری

بی فسفونات های خوراکی، به طور شایع در پیشگیری و درمان پوکی استخوان و نیز درمان سایر بیماری های استخوان مانند بیماری پاژه، مورد استفاده قرار می گیرند. این داروها مشتمل بر آلدرونات (Alendronate)، ریزدرونات (Risedronate)، ایباندرونات (Ibandronate)، ریزدرونات آهسته رهش، اتیدرونات (Etidronate) و تیلودرونات (Tiludronate) می باشند.

مطالعات صورت گرفته در رابطه با ایمنی فرآورده های مذکور، یافته های متفاوتی را در رابطه با خطر سرطان مری ناشی از این داروها ذکر می نمایند. ازوفازیت و سایر اختلالات ازوفازیتال به دنبال مصرف این فرآورده ها گزارش شده است به خصوص بیمارانی که دستورات خاص مصرف بی فسفونات های خوراکی را رعایت نمی کنند. اخیراً سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) طی اطلاعیه ای اعلام کرده که در حال مرور مطالعات منتشره در این خصوص می باشد. این سازمان اعلام نموده است که تاکنون نتیجه ای مبنی بر افزایش خطر سرطان مری در اثر مصرف بی فسفونات های خوراکی دریافت ننموده است. با این حال، در این اطلاعیه ذکر شده است که FDA همچنان به ارزیابی تمام داده های موجود در خصوص ایمنی و اثربخشی بی فسفونات ها ادامه خواهد داد و نتایج حاصل را به اطلاع عموم خواهد رساند. در این اطلاعیه پیشنهاد شده است که بیماران در رابطه با فواید و زیان های ناشی از مصرف بی فسفونات های خوراکی و نیز طول مدت مصرف فرآورده های مذکور با پزشک خود مشورت نمایند. همچنین بیماران بایستی در صورت مشاهده علائمی نظیر اختلال بلع، درد قفسه سینه، پیدایش سوزش سر معده یا بدتر شدن این عارضه و اشکال در بلع یا درد هنگام بلع با پزشک معالج مشورت کند. به بیماران توصیه شده است که دستورات مصرف بی فسفونات های خوراکی را به دقت رعایت نمایند.

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده گونه عارضه یا اشتباه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم های زرد و ارسال به صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ و یا از طریق سایت <http://fdo.behdasht.gov.ir> شماره ۸۸۸۹۰۸۵۷ یا از طریق تماس تلفنی ۴-۸۸۹۲۳۱۹۳ به مرکز ADR گزارش دهند.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

سازمان غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی